

Modele diagnozy

Nozologiczny	Funkcjonalny	Psychospołeczny
Konwencja medyczna	Przedmiotem poznania osobowość jednostki	Uwzględnia kontekst społeczny
Dla psychiatrów i neurologów. Diagnoza psychologiczna jest wtórna	W centrum zainteresowania adekwatność zachowania w stosunku do wymagań otoczenia oraz funkcjonalność procesów psychicznych	Praca diagnostyczna polega na zapewnieniu systemowi społecznemu możliwie dużej funkcjonalności
Przyczyny choroby w samym pacjencie	Zależna od orientacji teoretycznej. Brak bezwzględnych kryteriów diagnozy	O podjęciu czynności diagnostycznych decydują nie tylko właściwości badanych, ale też mechanizmy społeczne
Cel: przypisanie jednej z możliwych jednostek		Pacjent i otoczenie mają aktywny stosunek do diagnozy
Dychotomia		

Badania przesiewowe

Poziom 1	Wstępna identyfikacja ryzyka wśród całej populacji
CHAT	Checklist for Autism in Toddlers - Od 18 miesiąca życia - Wypełniany przez rodziców - 9 pytań kwestionariusz i obserwacja dziecka (zabawa, kontakt wzrokowy, wskazywanie)
M-CHAT	Modified Checklist for Autism in Toddlers - Wersja rozszerzona o dodatkowe pozycje: stereotypowe zachowania
Q-Chat	Qualitative Checklist for Autism in Toddlers - 25 pozycji - Dzieci w wieku 18-24 miesięcy dodatkowe pozycje: komunikowanie się, funkcjonowanie społeczne, zachowania stereotypowe



By KontoDoNauki

Published 27th May, 2026.
 Last updated 27th May, 2026.
 Page 1 of 3.

Sponsored by **ApolloPad.com**
 Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>

Badania przesiewowe (cont)

SCQ	Social Communication Questionnaire-kwestionariusz komunikacji społecznej
	- 40 pozycji
	- Wypełniany przez rodziców
	- Pytania zaczerpnięte z ADI-R
	- Dwie wersje: aktualne funkcjonowanie, funkcjonowanie na przestrzeni życia
	- Dobre właściwości psychometryczne
	- Dobra zgodność z wynikami ADI-R

Poziom 2

Diagnoza różnicowa

STAT	Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds
	- Dzieci 24-36 miesięcy
	- Swobodna zabawa, ok. 20 minut
	- 12 aktywności- ocena kluczowych zachowań społeczno-komunikacyjnych
	- zabawa, komunikacja, naśladowanie
	- Duża zgodność z ADOS-G
	- Czulość 0,92
	- Swoistość 0,85

Pozycje STAT

Zabawa

- Zabawa naprzemienna (samochód/piłka)
- Zabawa lalką

Proszenie

- Bańki mydlane
- Jedzenie

Kierowanie uwagi

- Balon
- Pacynka
- Torba zabawek
- Hałasujący pilot

Naśladowanie

- Grzechotka
- Poruszanie autkiem
- Bębnienie dłońmi
- Skaczący pies



By KontoDoNauki

cheatography.com/kontodonauki/

Published 27th May, 2026.
Last updated 27th May, 2026.
Page 2 of 3.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopadd.com>

Złoty standard diagnozy

ADOS 2

Autism Diagnostic Observation Schedule

4 moduły:

- T: Toddler Module- dzieci 12-31 m.ż., nieposługujące się zdaniami
- 1: Dzieci powyżej 31 m.ż., nieposługujące się zdaniami
- 2: Dzieci posługujące się zdaniami, ale nie komunikujące się płynnie
- 3: Młodzież szkolna posługująca się płynnie mową
- 4: Dorośli

Wywiad z rodzicami: ADI-R

Autism Diagnostic Interview-Revised

- Ponad 90 pytań
- Komunikowanie się
- Funkcjonowanie społeczne
- Stereotypowe zachowania i zainteresowania
- Rozwój dziecka
- Zabawa
- Wyjątkowe umiejętności

Obszary funkcjonowania badane w ADOS:

Ogólny poziom języka, intonacja, echolalie, konwersacja, wskazywanie, używanie gestów, kontakt wzrokowy, kierowanie wyrazów twarzy do innych, pokazywanie, reagowanie na bodźce społeczne, inicjowanie i reagowanie na wspólną uwagę, jakość i ilość reakcji społecznych, funkcjonalna zabawa, nietypowe zainteresowania sensoryczne, manieryzmy i rytuały, zachowania stereotypowe

Czynniki zwiększenia liczby diagnoz ASD

44%- niewyjaśnione

27%- zmiana kryteriów diagnostycznych

16%- wpływy społeczne

11%- późne rodzicielstwo

2%- geographic clustering



By KontoDoNauki

cheatography.com/kontodonauki/

Published 27th May, 2026.

Last updated 27th May, 2026.

Page 3 of 3.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish Yours!

<https://apollopad.com>